

Príloha č.1

**Zastúpenie biologík v reálnej praxi pri liečbe pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou**

<b>Liečba</b>	<b>1. voľba</b>	<b>2. voľba</b>	<b>3. voľba</b>	<b>4.+ voľba</b>
Adalimumab 40 mg	60,95 %	15,99 %	9,98 %	3,82 %
Apremilast 30 mg*	-	-	0,69 %	-
Etanercept 25 mg 2x týždenne**	18,74 %	6,72 %	4,68 %	2,06 %
Infliximab 5 mg/kg	2,10 %	1,28 %	1,38 %	39,42 %
Ixekizumab 80 mg	-	28,17 %	27,12 %	15,75 %
Sekukinumab 150 mg	-	21,41 %	25,95 %	16,26 %
Ustekinumab 45 mg	18,20 %	26,09 %	29,71 %	20,53 %
Ustekinumab 90 mg***	-	0,34 %	0,49 %	2,17 %
<b>Spolu</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

\*Oslovení lekári aj po cielejších otázkach trvali na nízkej preferencii preskripcie liečiva apremilast

\*\* Alebo etanercept 50 mg jedenkrát týždenne

\*\*\*Dávka indikovaná u pacientov s hmotnosťou nad 100 kg

Čísla sú vyjadrené na dve desatinné miesta, pri spätnom prepočte môžu vzniknúť odchýlky